

## بررسی شیوع سرویسیت و عوامل موثر بر آن در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شاهرود در سال ۱۳۹۵

فاطمه مهر آور: دانشگاه علوم پزشکی گلستان

### چکیده

**زمینه و هدف:** سرویسیت شایع ترین بیماری سیستم تناسلی زنان است که نیمی از تمام زنان در مقطعی از زندگی خود آن را تجربه کرده اند. معمولاً تشخیص بالینی از طریق معاینه گردن رحم صورت می گیرد و وجود سرویکس متورم چرکی همراه با اروژن (سرخ)، مویذ سرویسیت است. کلامیدیا تراکوماتیس از جمله شایعترین عوامل ایجاد کننده سرویسیت بوده که در ۷۰ درصد زنان بدون علامت است.

**روش بررسی:** این مطالعه از نوع مقطعی (Cross Sectional)، توصیفی تحلیلی بر ۳۴۶ خانم های متاهل با دامنه سنی ۱۸-۷۰ سال، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شاهرود طی سال ۱۳۹۵ انجام شده است. برای تشخیص سرویسیت ابتدا ناحیه اندوسرویکس خانم های مراجعه کننده از نظر سرویسیت توسط مامای باتجربه یا متخصص زنان معاینه شد. برای تشخیص سرویسیت دو نشانه وجود دارد (۱) وجود چرک یا موکوس چرکی در ترشحات اندوسرویکس (۲) چنانچه سواب به جدار اندوسرویکس مالیده شود به آسانی خونریزی نماید.

**یافته ها:** از بین ۳۴۶ خانم شرکت کننده در این مطالعه، تعداد ۱۲۱ نفر (۳۵ درصد) مبتلا به سرویسیت بودند و در این مطالعه تشخیص داده شدند. شیوع سرویسیت با هیچ کدام از اطلاعات دموگرافیک رابطه معناداری نداشت. شیوع ابتلا به سرویسیت با تعداد دفعات نزدیکی در هفته ( $p=0.004$ ) و نوع زایمان ( $p=0.02$ ) رابطه معنادار آماری داشت اما با سایر سوابق مرتبط به زنانگی رابطه ای دیده نشد. شیوع ابتلا به سرویسیت با ترشح از واژن ( $p=0.03$ ) و سابقه ابتلا به تبخال تناسلی ( $p=0.04$ ) نیز رابطه معناداری داشته است در حالی که با سایر علائم بالینی شرکت کنندگان رابطه ای دیده نشده است.

**نتیجه گیری:** در مطالعه حاضر شیوع سرویسیت ۳۵ درصد به دست آمد که کمی بیشتر از آمار به دست آمده در آمریکا و تحقیقات دیگر است. عوامل متعددی از جمله جمعیت مورد مطالعه، تعداد نمونه، روش تشخیصی، سن بیماران، نژاد، فرهنگ و منطقه جغرافیایی این شیوع مختلف را توجیه نماید.

**واژه های کلیدی:** سرویسیت، زنان، دهانه رحم، عفونت های منتقله از راه جنسی.